



5th MIDDLE EUROPEAN MATHEMATICAL OLYMPIAD
VARAŽDIN 2011 CROATIA

language : French

5. Olympiade de Mathématiques d'Europe Centrale

COMPÉTITION PAR ÉQUIPE

4. SEPTEMBRE 2011

Problème T-1.

Trouver toutes les fonctions $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telles que :

$$y^2 f(x) + x^2 f(y) + xy = xyf(x+y) + x^2 + y^2$$

pour tout $x, y \in \mathbb{R}$, où \mathbb{R} est l'ensemble des nombres réels.

Problème T-2.

Soit a, b, c des nombres réels positifs tels que

$$\frac{a}{1+a} + \frac{b}{1+b} + \frac{c}{1+c} = 2.$$

Prouver que

$$\frac{\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}}{2} \geq \frac{1}{\sqrt{a}} + \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{c}}.$$

Problème T-3.

Pour un entier $n \geq 3$, soit \mathcal{M} l'ensemble $\{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{Z}, 1 \leq x \leq n, 1 \leq y \leq n\}$ formé de points du plan. (\mathbb{Z} est l'ensemble des entiers.)

Quel est le nombre maximal de points que peut posséder un sous-ensemble $S \subseteq \mathcal{M}$ qui ne contient pas trois points distincts formant les sommets d'un triangle rectangle ?

Problème T-4.

Soit $n \geq 3$ un entier. Dans une compétition semblable à la MEMO, il y a $3n$ participants, il y a n langues parlées, et chaque participant parle exactement trois langues différentes.

Prouver qu'au moins $\left\lceil \frac{2n}{9} \right\rceil$ des langues parlées peuvent être choisies de manière à ce qu'aucun participant ne parle plus que deux des langues choisies.

($\lceil x \rceil$ est le plus petit entier supérieur ou égal à x .)

Problème T-5.

Soit $ABCDE$ un pentagone convexe dont les cinq côtés ont la même longueur. Les diagonales AD et EC se coupent en S et on suppose $\angle ASE = 60^\circ$. Prouver que $ABCDE$ possède une paire de côtés parallèles.

Problème T-6.

Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus. Soit B_0 et C_0 les pieds des hauteurs issues de B et C , respectivement. Soit X un point à l'intérieur du triangle ABC tel que la droite BX soit tangente au cercle circonscrit du triangle AXC_0 et la droite CX soit tangente au cercle circonscrit du triangle AXB_0 . Montrer que la droite AX est perpendiculaire à la droite BC .

Problème T-7.

Soit A et B des ensembles disjoints non-vides tels que $A \cup B = \{1, 2, 3, \dots, 10\}$. Montrer qu'il existe des éléments $a \in A$ et $b \in B$ tels que le nombre $a^3 + ab^2 + b^3$ est divisible par 11.

Problème T-8.

Un entier positif n est appelé *surprenant* s'il existe des entiers positifs a, b, c tels que l'égalité suivante est satisfaite :

$$n = (b, c)(a, bc) + (c, a)(b, ca) + (a, b)(c, ab)$$

Prouver qu'il existe 2011 entiers positifs consécutifs qui sont *surprenants*.

((m, n) représente le plus grand diviseur commun des entiers positifs m et n .)

Durée: 5 heures

Temps pour les questions: 45 min

Chaque problème vaut 8 points.

L'ordre des problèmes ne dépend pas de leur difficulté.