



5. Olympiade de Mathématiques d'Europe Centrale

COMPÉTITION INDIVIDUELLE

3. SEPTEMBRE 2011

Problème I-1.

Initialement, seul l'entier 44 est écrit sur un tableau. Un entier a , écrit sur ce tableau, peut être remplacé par quatre entiers différents a_1, a_2, a_3, a_4 tels que la moyenne arithmétique $\frac{1}{4}(a_1 + a_2 + a_3 + a_4)$ des quatre nouveaux entiers est égale au nombre a . Une étape consiste à remplacer simultanément tous les entiers écrits sur le tableau selon la méthode décrite ci-dessus. Après 30 étapes, on s'arrête avec $n = 4^{30}$ entiers b_1, b_2, \dots, b_n sur le tableau. Prouver que

$$\frac{b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2}{n} \geq 2011.$$

Problème I-2.

Soit $n \geq 3$ un entier. Jean et Marie jouent au jeu suivant. Au début, Jean numérote les côtés d'un n -gone régulier avec les nombres $1, 2, \dots, n$ dans l'ordre qu'il veut, en utilisant chaque nombre exactement une fois. Ensuite Marie découpe ce n -gone en triangles, en dessinant $n - 3$ diagonales qui ne se coupent pas l'une l'autre à l'intérieur du n -gone. Toutes ces diagonales sont numérotées par le nombre 1. A l'intérieur de chaque triangle, on écrit le produit des nombres situés sur les côtés de ce triangle. Soit S la somme de ces $n - 2$ produits.

Déterminer la valeur de S si Marie veut que le nombre S soit le plus petit possible et si Jean veut que S soit le plus grand possible et s'ils font tous les deux les meilleurs choix possibles.

Problème I-3.

Dans un plan, les cercles \mathcal{K}_1 et \mathcal{K}_2 de centre I_1 et I_2 , respectivement, se coupent en deux points A et B . On suppose que $\angle I_1 A I_2$ est obtus. La tangente à \mathcal{K}_1 en A coupe \mathcal{K}_2 une deuxième fois en C et la tangente à \mathcal{K}_2 en A coupe \mathcal{K}_1 une deuxième fois en D . Soit \mathcal{K}_3 le cercle circonscrit au triangle BCD . Soit E le milieu de l'arc CD de \mathcal{K}_3 qui contient B . Les droites AC et AD coupent \mathcal{K}_3 une deuxième fois en K et L , respectivement. Prouver que la droite AE est perpendiculaire à la droite KL .

Problème I-4.

Soit k et m , avec $k > m$, deux entiers positifs tels que le nombre $km(k^2 - m^2)$ est divisible par $k^3 - m^3$. Prouver que $(k - m)^3 > 3km$.

Durée: 5 heures

Temps pour les questions: 45 min

Chaque problème vaut 8 points.

L'ordre des problèmes ne dépend pas de leur difficulté.